



# Les infections sexuellement transmissibles

Une infection sexuellement transmissible est une infection donnée pendant une relation sexuelle.

On dit aussi IST. Avant, les IST s'appelaient MST.

## COMMENT JE PEUX AVOIR UNE IST ?

Une IST est donnée pendant une relation sexuelle.

Je peux avoir une IST si je touche le sexe d'une personne qui a une IST.

Je peux donner une IST à une personne qui touche mon sexe si j'ai une IST.

## QUI PEUT AVOIR UNE IST ?

Tout le monde peut avoir une IST.

Les hommes et les femmes peuvent avoir une IST.

## COMMENT SE PROTÉGER D'UNE IST ?

Je dois utiliser un préservatif pour avoir une relation sexuelle.

Il existe des préservatifs pour les femmes et pour les garçons.

Je peux être vacciné contre le papillomavirus et l'hépatite B.

Le papillomavirus et l'hépatite B sont des infections sexuellement transmissibles.

## COMMENT SAVOIR SI J'AI UNE IST ?

Je vais chez :

- un médecin
- un gynécologue
- un dermatologue
- ou une sage-femme.

Je lui demande de regarder mon sexe.

Il peut me faire un frottis.


Il peut me dire de faire d'autres examens.

Je peux faire une prise de sang ou une analyse d'urine.

Les résultats diront si j'ai une IST.

Je peux aussi aller dans un laboratoire de biologie médicale pour faire une prise de sang. Je peux aller quand je veux. Je n'ai pas besoin de rendez-vous.

Je fais une prise de sang pour savoir si j'ai le VIH. Le VIH est une infection sexuelle transmissible. Le VIH donne le sida.



# Les infections sexuellement transmissibles

## QUAND FAIRE UN DÉPISTAGE POUR UNE IST ?

Je fais un dépistage quand j'ai une relation sexuelle non protégée.

Je fais un dépistage quand j'ai une relation sexuelle sans préservatif.

## JE DOIS FAIRE QUOI SI J'AI UNE IST ?

### Je dois me soigner :

Mon docteur me donne une ordonnance pour avoir des médicaments.

Je vais avec mon ordonnance chez le pharmacien.

Le pharmacien me donne une pommade, des médicaments, des ovules ou une piqûre.

Attention, certaines IST ne se soignent pas !

### Je le dis à mon partenaire :

Je dis à mon partenaire que j'ai une IST.

Je le dis à mon partenaire avant qu'il touche mon sexe.

Je mets un préservatif pour protéger mon partenaire.

## QUELS SONT LES SIGNES D'UNE IST ?

Je peux avoir une IST au niveau du sexe ou de l'anus.

Je peux avoir :

- Des boutons
- Des écoulements
- Des brûlures
- Des démangeaisons
- Des douleurs en bas du ventre quand je fais pipi
- De la fièvre
- La peau jaune
- Des douleurs dans les articulations

Si j'ai un de ces signes, je dois le dire à mon docteur.